

REZIST



FICHA TÉCNICA

| | | |
|----------------------|----------------|-------|
| Formulación: | LÍQUIDO | |
| Composición Química: | COBRE (Cu) | 1,75% |
| | MANGANESO (Mn) | 1,75% |
| | ZINC (Zn) | 1,75% |
| pH | 9,4 | |

GENERALIDADES:

REZIST Incrementa la resistencia natural de la planta contra las toxinas de las enfermedades mediante la activación de la Resistencia Sistémica Adquirida de la planta. Ésta activa la resistencia contra el estrés Biótico (Hongos, Bacterias, Virus, Nemátodos) y Abiótico (salinidad, inundaciones, sequías, etc.).

REZIST Contiene innovadores componentes que aumentan la expresión genética responsable de la activación de la RESIA.

REZIST Controla la producción de Etileno causado por cualquier estrés biótico o abiótico.

REZIST Dirige el Ciclo de la Metionina (Ciclo SAM) a la producción de Súper Poliaminas, que actúan como una vacuna.

VENTAJAS:

REZIST Contiene Cobre, Manganeseo, Zinc y una combinación de Poliaminas que activa e incrementa la expresión genética incrementando la RESIA.

REZIST Logra una mayor resistencia al ataque de nematodos y virus.

REZIST Forma nueva cabellera radicular.

REZIST Ayuda a superar daños causados por plagas.

REZIST Regenera los tejidos dañados por factores negativos de la producción.

DOSIS RECOMENDADAS Y FORMAS DE APLICACIÓN:

Preventivamente: Usar **REZIST** de 1 a 2 lts / ha. junto con el fungicida. Repetir la aplicación cada 14 a 21 días. Realizar 3 a 5 aplicaciones. Mantener altos niveles de calcio en la planta.

Curativamente: Usar **REZIST** a 2.5 lts / ha para contrarrestar virus, nemátodos, y otras enfermedades que no se pueden controlar en forma efectiva empleando los productos fitosanitarios convencionales. Usar **REZIST** mas el fungicida a la dosis recomendada por el fabricante. La concentración ideal es del 1%. Repetir la aplicación 15 a 20 días más tarde.

Use una concentración de **REZIST** no menor a 0.5% y no mayor a 1%. A fin de obtener una mayor expresión de las ventajas de **REZIST**, recomendamos su aplicación con **SETT** en la misma proporción o igual dosis de aplicación.

RECOMENDACIONES ESPECIALES Y CULTIVOS RECOMENDADOS:


REPETIR APLICACIÓN SIEMPRE ANTES DE LOS 20 DÍAS.

REZIST Puede ser empleado junto con la mayoría de plaguicidas .El orden de mezcla recomendado es:

1-AGUA 2- SETT 3- **REZIST** 4-PLAGUICIDA

STOLLER RECOMIENDA USAR SIEMPRE **REZIST** CON **SETT** EN RELACIÓN 1 :2

Se puede utilizar **REZIST** en todos los cultivos siguiendo las instrucciones de la etiqueta.



ReZist dirige el Ciclo de la Metionina (Ciclo SAM) a la producción de Súper Poliaminas, responsables de la Resistencia Sistémica Adquirida de la planta.

PRESENTACION DE VENTA:

1 LT 20 LT

Importado y distribuido por: AGRONPAXI CIA. LTDA.
Fabricado por: STOLLER INTERNATIONAL INC.

PARA MAS INFORMACIÓN CONSULTE CON EL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE AGRONPAXI CIA.LTDA. info@agronpaxi.com / www.agronpaxi.com

PRECAUCIONES

Agítese antes de usar. Debe guardarse en su empaque original en lugar seguro, fresco y seco. No cambie de su envase original. Manténgase fuera del alcance de los niños, los animales y personas irresponsables. No mezcle con productos que no sean aprobados por el fabricante. Realice primero una prueba de compatibilidad en un recipiente empleando las proporciones que utilizará en la aplicación para establecer la compatibilidad física de los productos.

PELIGRO

Su ingestión es dañina. Evite su inhalación. Puede causar irritación en la nariz, garganta y/o piel. Evite el contacto con ojos, piel y ropa. En caso de que haya sido ingerido, provoque el vómito introduciendo el dedo en la garganta del paciente. Nunca le dé nada en forma oral a una persona inconsciente. En caso de que los ojos hubieran estado en contacto, lavarlos con abundante agua por lo menos 15 minutos. Obtenga ayuda médica.

GARANTÍA

El fabricante garantiza que este producto contiene los ingredientes especificados y razonablemente sirve para los propósitos aquí indicados cuando se usa de acuerdo a las instrucciones bajo circunstancias normales. Nadie, excepto el representante legal del fabricante, está autorizado para hacer alguna garantía o instrucción sobre el producto.

Debido a que el almacenamiento, la época, lugar y dosis de aplicación están fuera del control del vendedor, eventuales daños a causa del mal uso o almacenamiento, no son responsabilidad del vendedor.