



COMPOSICIÓN Y CONCENTRACIÓN		
	P/V	P/P
AZUFRE (S)	73,0%	50,0%
COBRE (Cu)	6,5 %	4,4%
pH 6,0 – 6,5		
COMPATIBILIDAD ORGÁNICA		





APLICACIÓN FOLIAR

Top Cop es una formulación a base de sulfato de cobre tribásico y azufre fluido micronizado.

Top Cop es un fertilizante foliar que por sus fuentes tiene acción fungistática y acaricida.

Top Cop con un tamaño de partícula inferior a 2 micras garantiza: mejor cobertura, rápido efecto de acción y resistencia al lavado.

En la lámina foliar las partículas finas de azufre elemental de **Top Cop** se combinan gradualmente con el oxígeno del aire para formar sulfato. El sulfato en la superficie de la hoja crea un ácido suave que disuelve el sulfato de cobre tribásico en el ion de cobre soluble necesario para controlar bacterias y hongos.

Top Cop no genera ningún daño ni fitotoxicidad a los tejidos, debido a que el cobre soluble se libera gradualmente.

INSTRUCCIONES DE USO

Disuelva en un recipiente pequeño la dosis recomendada del producto. Posteriormente agregue la mezcla al tanque de aplicación que contenga la mitad del volumen de agua a utilizar, agite y complete el agua requerida, mueva la mezcla hasta homogenizar antes de cada aplicación. Aplicar en las horas de menos Sol, ya sea en las primeras horas de la mañana o en las últimas de la tarde.

TOP COP puede aplicarse por vía aérea mediante el uso de avionetas, vía terrestres con equipos como bomba de espalda manual o de motor y vía sistemas tecnificados de fertirriego y/o aspersión. TOP COP no requiere el uso de adherentes, no deja residuos, y puede ser empleado 24 horas antes de la cosecha. Su tamaño de partícula inferior a 2 micras garantiza mejor cobertura, rápido efecto de acción y resistencia al lavado.

MEZCLAS: EMULSIÓN:

1. Agregar la dosis de aceite agrícola recomendada.
2. Agregar la dosis de emulsificante que oscila entre 1 a 1,5% respecto al volumen de aceite agrícola. Mezclar por 3 minutos a 1800 rpm.
3. Agregar el 60 % del volumen de agua recomendado y seguir mezclando por 3 minutos mas a 1800 rpm.
4. Agregar la dosis de TOP COP y seguir mezclando por 3 minutos mas a 1800 rpm. Si la mezcla contempla otro agroquímico, este debe ser agregado en este punto. Completar el volumen de la mezcla total con agua y seguir mezclando por 3 minutos mas a 1800 rpm.

DILUCIÓN EN AGUA:

1. Agregar el 70% del volumen de agua recomendando.
2. Agregar la dosis de TOP COP y mezclar por 3 a 4 minutos ya sea a altas revoluciones (1800 rpm) o recirculación.
3. Completar el volumen total de la mezcla con agua y seguir mezclando por 3 minutos más.

INCOMPATIBILIDAD: No mezcle con productos que contengan Calcio por el riesgo de precipitación.

PARA MÁS INFORMACIÓN CONSULTE CON EL DEPARTAMENTO TÉCNICO DE AGRONPAXI CIA. LTDA.
info@agronpaxi.com/www.agronpaxi.com

CULTIVO	DOSIS	ÉPOCA DE APLICACIÓN	FRECUENCIA DE APLICACION	VIA DE APLICACION
Banano <i>Musa paradisiaca</i>	1,0 – 1,5 L/ha (si va solo) 0,75 – 1,0L/ha (si va en coctel)	Todo el ciclo del cultivo	A ritmo de emisión foliar	Foliar
Plátano <i>Musa paradisiaca</i>	1,0 – 1,5 L/ha (si va solo) 0,75 – 1,0L/ha (si va en coctel)	Todo el ciclo del cultivo	A ritmo de emisión foliar	Foliar
Arroz <i>Oryza Sativa</i>	0.75 L/Ha/200 L	Cuando la planta tenga de 3 o más pares de hojas verdaderas.	Cada 15 días	Foliar.
Cacao <i>Theobroma cacao</i>	1.50 L/Ha/ 200 L	Iniciar las aplicaciones durante el crecimiento vegetativo.	Cada 30 días	Foliar
Mango <i>Mango mangifera</i>	0.75 L/Ha/200 L	Aplicación foliar al primer racimo floral.	Cada 15 días	Foliar
Papa <i>Solanum tuberosum</i>	0.75 L/Ha/200 L	Aplicación vía foliar durante el crecimiento vegetativo.	Cada 15 días	Foliar
Brócoli <i>Brassica oleareca</i>	0.75 L/Ha/200 L	Aplicación vía foliar durante el crecimiento vegetativo.	Cada 15 días	Foliar
Tomate <i>Solanum Lycopersicum</i>	0.75 L/Ha/200 L	Aplicación vía foliar durante el crecimiento vegetativo.	Cada 15 días	Foliar

PRESENTACIÓN DE VENTA:
1 LT 20 LT

REGISTRO AGROGALIDAD. **1539-F-AGR**

Titular del registro y fabricante:
AGRONPAXI CIA. LTDA.
Panamericana Norte Km 12
Latacunga – Ecuador
Tel: (593) 3 2719113
Duran - Ecuador
Tel: (593) 4 3901595
Fabricado por:
STOLLER ENTERPRISES INC.
USA
STOLLER ENTERPRISES INC.
PERÚ



EN CASO DE EMERGENCIA LLAME AL: 1800VENENO (836366) Atención las 24 horas del día. AGRONPAXI: 0994423585

**CONSERVESE EN LUGAR CERRADO Y FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS.
NO INGERIR**

"La información presentada sirve como referencia, la cual puede acogerse de acuerdo con el estado y requerimiento nutricional del cultivo, condiciones de clima, y propiedades físicas y químicas del suelo". **"Es importante determinar las condiciones locales de cada cultivo y seguir las recomendaciones del especialista."**

PRECAUCIONES:

Durante la preparación y utilización del producto "NO COMER, BEBER O FUMAR". "USAR: Ropa protectora adecuada, guantes, delantal, overol, botas, gafas, casco o gorra, mascarilla contra la neblina de aspersión, respirador, etc." "ANTES DE COMER, BEBER O FUMAR, sacarse la ropa contaminada, lavarse bien las partes expuestas de la piel con abundante agua y jabón." "No aplicar le producto en las superficies que puedan entrar en contacto con alimentos". "Conservar el producto lejos de las bebidas y los alimentos para las personas y los animales." "No permita animales en el área tratada." "No contamine fuentes de agua." "Conservar el producto en el envase original etiquetado y cerrado herméticamente." "No emplear este envase para ningún otro fin." "No re envasar o depositar el contenido en otros envases." "Conservar el envase en un lugar seguro, fresco y seco y lejos de alimentos, los niños y los animales." "Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación, inutilicelo triturándolo o perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades para este fin."

